



## **Komunikat sadowniczy SKS 9 2015-05-12**

### **PARCZ JABŁONI**

Ostatnie opady wywołały średnie infekcje parcha jabłoni. Zabiegi zapobiegawcze wykonane przed deszczem zabezpieczyły przed tymi infekcjami. Lokalnie konieczny może być zabieg interwencyjny - w zależności od temperatury podczas zabiegu zalecamy: **Batalion 450 SC 0,7 l/ha** lub **Score 250 SC 0,2 l/ha**. W kolejnych dniach zalecamy kontynuowanie ochrony zapobiegawczej za pomocą Delanu 70WG 0,5kg/ha lub produktami opartymi na kaptanie: **Kaptan Zaw. 50 WP 3 kg/ha** lub **Captan 80 WG** w dawce 1,9 kg/ha.

### **ZARAŻA OGNIOWA**

Pod koniec kwitnienia wzrasta zagrożenie ze strony zarazy ogniowej. Nowym zarejestrowanym preparatem do zwalczania tej choroby jest: **Plantivax** w dawce 0,75 l/ha.

### **OWOCNICA JABŁKOWA, MSZYCA JABŁONIOWA**

Na owocnicę pod koniec opadania płatków kwiatowych należy wykonać oprysk preparatem **Calypso 480SC 0,15 l/ha** lub Mospilan 20SP 0,125 kg/ha. Na mszycę jabłoniową polecamy: **Calypso 480SC 0,2 l/ha**, Mospilan 20SP 0,125 kg/ha, Pirimor 500WG 0,4 kg/ha lub Movento 100SC 2,25 l/ha. Zwalczanie należy przeprowadzić jeśli lustracje wykazały przekroczenie progu ekonomicznej szkodliwości.

### **MIODÓWKA GRUSZOWA**

Po stwierdzeniu w sadzie dużej liczebności larw po kwitnieniu zalecany jest zabieg jednym z preparatów: **Apacz 50WG 0,15 kg/ha**, Acaramik 018EC 0,75 l/ha, lub Movento 100SC 2,25 l/ha.

### **PRZĘDZIORKI**

Po kwitnieniu należy monitorować liczebność populacji przędziorków. W przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości zalecamy zabieg jednym z preparatów: **Envidor 240SC 0,4l/ha**, Sumo 10 EC 0,75 l/ha, Zoom 0,45 l/ha.

### **NAWOŻENIE DOLISTNE SADÓW**

Na kwaterach, gdzie występują problemy z jakością liści należy wykonać zabieg stosując mieszaninę produktu aminokwasowego oraz nawozu mikroelementowego bogatego w magnez i żelazo. Zalecamy preparaty: **Megafol 2,5 l/ha + OptiMikro 2,5 kg/ha**. Zabieg należy powtórzyć po 7-10 dniach.

### **MALINA – ZAMIERANIE PĘDÓW**

Wzrosło zagrożenie ze strony zamierania pędów na malinach. Zalecamy opryskiwanie młodych przyrostów jednym z preparatów: **Signum 33WG 1,8 kg**, Switch 62,5 WG 1 kg/ha, Sadoplion 75WP 3kg, Rovral Aquaflo 500SC 1,5 l/ha.

### **PRZYMROZKI**

W najbliższych dniach prognozowane są przymrozki. Przed spodziewanym przymrozkiem zalecamy wykonanie zabiegu preparatem zawierającym aminokwasy roślinne: **Megafol 2,5l/ha**.

SKS 9 2015 Parcz: Interwencyjnie: Batalion/Score zapobiegawczo: Kaptan 3kg Dolistnie: Megafol 2,5L+Optimicro 3kg. Zaraza: Plantivax 0,75L Owocnica/mszyce: Calypso 0,2L. Miodówka: Apacz 0,15kg. Przędziorek: Envidor 0,4L Malina: Signum 1,8kg Przymrozki: Megafol 2,5L [http://zzowarka.pl/download/SKS\\_9\\_2015.pdf](http://zzowarka.pl/download/SKS_9_2015.pdf)