

System Komunikatów Sadowniczych – SKS – zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy **FRUIT AKADEMIA**. System SKS realizowany jest przy współudziale władz samorządowych gmin: **Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, Góra Kalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga.**



Komunikat sadowniczy SKS XXIII 2012-11-12

NAWOŻENIE DOLISTNE BOREM ORAZ CYNKIEM

W związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz korzystną prognozą na najbliższe dni proponujemy wykonać zabieg preparatami zawierającymi cynk oraz bor. W sadach liście stały się już wyraźnie żółte oraz intensywnie opadają, zabieg cynkiem i borem będzie mało efektywny. Jednak w sadach gdzie drzewa są w lepszej kondycji oraz nie występuje jeszcze intensywny opad liści **zabieg cynkiem i borem jest wskazany**. Preparaty bogate w bor oraz cynk stosowane przed okresem zimowym (w okresie pomiędzy zakończeniem zbiorów owoców a początkiem opadania liści) zwiększają mrozoodporność drzew oraz wzmacniają pąki kwiatowe. Bor jest również ważnym składnikiem pokarmowym w okresie kwitnienia i wiązania owoców. W kwaterach gdzie tegoroczne zbiory były wysokie, zabieg cynkiem i borem jest szczególnie ważny. Zalecamy zastosować gotową mieszankę cynku, boru oraz azotu w postaci nawozu:

FruitAkademia po zbiorach – w dawce 7,5 kg/ha.

CHOROBY ZGORZELOWE

W okresie po zbiorczym w celu ograniczenia infekcji chorobami zgorzelowymi należy wykonać zabieg preparatem:

Topsin M 500 SC w dawce 1,5 l ha.

Zabieg ten jest szczególnie ważny w przypadku odmian wrażliwych na choroby drewna i kory np.: Gala, Szampion, Idared. Opryskiwanie należy wykonać możliwie jak najszybciej po zbiorze owoców.

MOCZNIK W TRAKCIE OPADANIA LIŚCI

Na odmianach jabłoni gdzie rozpoczął się już intensywny opad liści należy zastosować mocznik w dawce 50 kg/ha w celu ograniczenia źródła infekcji pierwotnych parcha jabłoni.